1er Mars 1911 — Ve Série, 41e Année — No 485

# LA FEUILLE
# DES JEUNES NATURALISTES

## SUR QUELQUES INSECTES NÉVROPTÈRES

### De Saint-Nazaire (Loire-Inférieure) et voisinages

Dans de différents envois mon actif correspondant M. G. Revelière, de Saint-Nazaire, m'a envoyé plusieurs Névroptères (*lato sensu*, Odonates et Trichoptères compris) qu'il avait récoltés dans ses excursions entomologiques. Je pense que leur énumération méthodique sera utile pour la connaissance de la faune névroptérique de France, un peu négligée peut-être; d'autant plus, que quelques-uns d'entre eux offrent des particularités dignes de mention.

Voici donc la liste des chasses de M. Revelière :

**Libellulides.** — *Libellula depressa* L., Saint-Nazaire, mai, juin. — *Leptetrum 4-maculatum* L., Saint-Nazaire. — *Sympetrum meridionale* Sel., Saint-Nazaire, Mindin. — *Sympetrum striolatum* Charp., Saint-Nazaire. — *Oxygastra Curtisi* Dal., Blain.

**Eschnides.** — *Brachytron pratense* Müll., Saint-Nazaire, 14, 29 mai. — *Æschna mixta* Latr., Saint-Nazaire, août, septembre.

**Agrionides.** — *Agrion* (Calopteryx auct.) *virgo* L., Nantes, sept. — *Lestes viridis* Van der Lind., Saint-Nazaire, août. — *Lestes virens* Charp., Saint-Nazaire, juillet, août; Mindin, septembre. — *Lestes sponsus* Hans., Saint-Nazaire. — *Lestes barbarus* Fabr., Saint-Nazaire; 8 septembre, Saint-Brevin. — *Sympecma fusca* Van der Lind., Saint-Nazaire, Mindin, mars-septembre. Espèce hibernante. — *Platycnemis acutipennis* Sel. Saint-Nazaire, juillet, septembre. — *Platycnemis pennipes* Pall., Blain. — *Pyrrhosoma nymphula* Sulz., Saint-Nazaire, juin, juillet. — *Cœnagrion* (Agrion auct.) *puella* L., Saint-Nazaire. — *Cœnagrion pulchellum* Van der Lind., Saint-Nazaire. — *Cœnagrion mercuriale* Charp., Saint-Nazaire. — *Cercion Lindeni* Sel., Saint-Nazaire, Blain, juillet. — *Ischnura elegans* Charp., Saint-Nazaire, mai-septembre.

**Ephémérides.** — *Habrophlebia fusca* Curt., Saint-Nazaire, 12 juin, subimago. — *Cloeon diptérum* L. Saint-Nazaire. Espèce commune, de toute la faune paléarctique.

**Perlides.** — *Isogenus nubecula* Newm., Saint-Nazaire, juillet. — *Nemura variegata* Oliv., Saint-Nazaire, Saint-André-des-Eaux, 2 avril-5 juin.

**Myrméléonides.** — *Megistopus flavicornis* Rossi. Pornichet, 16 juin. Observé dans plusieurs localités de la région méditerranéenne; je le crois nouveau pour la région atlantique. — *Myrmeleon inconspicuus* Ramb. Pornichet, bois de pins, juillet. — *Myrmeleon nostras* Fourcr. (*europæus* Mac

Lachl.). Saint-Brevin. Souvent confondu avec le *M. formicarius* auct. — *Acanthaclisis occitanica* Vill. Mindin, dans les dunes, septembre. Localité septentrionale à remarquer de cette espèce, un peu rare, de l'Europe méridionale et de l'Asie occidentale.

**Chrysopides.** — *Chrysopa vulgaris* Selm. Saint-Nazaire. — *Chrysopa flavifrons* Brau. Saint-Nazaire, septembre. — *Chrysopa 7-punctata* Wesm. Saint-Nazaire. — *Chrysopa 7-punctata* Wesm. var. *pallens* Ramb. Saint-Nazaire, 30 juin. — *Chrysopa perla* L. Saint-Nazaire. — *Chrysopa prasina* Burm. Blain. — *Chrysopa prasina* Burm. var. *adspersa* Wesm. Saint-Nazaire. — *Nothochrysa capitata* Fab. Saint-Nazaire, 5 juin. Je ferai remarquer l'existence du *thyridium*, tache pâle bien connue à l'aile antérieure des Trichoptères, et aussi aux deux ailes des Panorpides. Je ne l'ai observée jusqu'à présent dans aucune autre espèce de Chrysopides. Il se trouve ici, comme d'ordinaire, sur la veine procubitale (media) de l'aile antérieure et précisément au commencement de la 3e cellule procubitale typique (fig. 1). C'est une particularité qui est à rechercher dans d'autres Chrysopides et que je n'avais pas vue citée par aucun auteur dans cette famille.




FIG. 1a.
*Nothochrysa capitata* Fab.
Région basilaire de l'aile antérieure.
1, 2, 3. Premières cellules procubitales *th. thyrilium*.

**Hemérobides.** — *Drepanopteryx phalenoïdes* L., Blain, 28 juillet, dans un pommier; très rare ici, m'écrit M. Revelière. *Hemerobius marginatus* Steph. Saint-Nazaire. — *Hemerobius humuli* L. Saint-Nazaire.

**Sialides.** — *Sialis lutaria* L. Blain, avril.

**Panorpides.** — *Panorpa communis* L. Saint-Nazaire, mai-août. — *Panorpa communis* L. var. *vulgaris* Imhoff. Saint-Nazaire, 8 septembre. — *Panorpa germanica* L. Saint-Nazaire, mai, août.

**Phryganides.** — *Phryganea varia* Fabr. Saint-Nazaire, juillet.

**Limnophilides.** — *Glyphotælius pellucidus* Retr. Saint-Nazaire, août. — *Limnophilus marmoratus* Curt. Saint-Nazaire. — *Limnophilus flavicornis* Fabr. Saint-Nazaire. — *Limnophilus affinis* Curt. Saint-Nazaire. — *Limnophilus auricula* Curt. Saint-Nazaire, Blain.

Saragosse (Espagne). LONGIN NAVAS S. P.

---

# LE GENRE EVONYMUS

## Liste des espèces européennes et *exotiques (principales); leurs parasites : insectes et champignons inférieurs.

*Evonymus* L.
— **americanus* L.
— *** — var. *obovatus*.
— **angulatus* Wight.
— **atropurpureus* Jacq.
— **bullatus* Wall.
— **crenulatus* Wall.
— **echinatus* Wall.
— *europæus* L. pr. part. = *vulgaris* Scop.

*Evonymus fimbrialus*.
— **garcinifolius* Roxb.
— **Goughii* Wight.
— **grandiflorus* Wall.
— *japonicus* Thunb (acclimaté)
— — var. *aurea* (acclimaté).
— **javanicus* Thunb.
— L. *latifolius* C. Benth. = *vulgaris* Scop.
— *latifolius* Scop.